Vestnik zoologii 32(5-6): 102, 1998 © 1998 А. И. Смирнов



3AMETKA

Новое место обнаружения некоторых видов бычков (Pisces, Gobiidae) в Днепре. — [The New Discover Place of Some Species of Bullheads (Pisces, Gobiidae) in Dnieper] — По результатам изучения коллекций ихтиологических фондов Зоологического музея ННПМ НАН Украины для некоторых видов установлено местонахождение, а именно: Украина, Киевская обл., окр. г. Киева, р. Днепр, гидропарк напротив Киево-Печерской Лавры, участок выхода камней. Все нижеперечисленные особи выловлены спиннингом 11.09.1994 г. (коллектор В. А. Костюшин, определение автора): Neogobius kessleri kessleri (Günther, 1861), инв. № 5203, 1 экз., 1 = 186,5 мм; Caspiosoma caspium (Kessler, 1877), инв. № 5232, 1 экз., 1 = 65,5 мм; Benthophiloides brauneri Beling et IIjin, 1927, инв. № 5233, 1 экз., 1 = 76,0 мм. Если обнаружение первого экземпляра могло быть прогнозировано (высшая точка его распространения вверх по Днепру — окр. с. Вишенки), то двух других - уникально, поскольку их ареал до сих пор ограничивался эстуарными участками южных рек Украины и прилегающими опресненными участками Черного моря. Приведенные данные свидетельствуют о продолжающемся распространении бычковой фауны в бассейне Днепра в результате зарегулирования речного стока и укрепления берегов реки гранитными насыпями. — А. И. Смирнов (Зоологический музей Национального научно-природоведческого музея НАН Украины).